

– Polychimiothérapie anti-bacillaire –

Traite > L'infection à *Mycobacterium leprea*

Durée > 6 à 12 mois, parfois plus prolongée

LAMPRÈNE 100 mg (Clofazimine)



1 CAPSULE LE MATIN

Effets indésirables les plus fréquents

- Coloration cuivrée des conjonctives et peau, larmes, urines, selles
- Sécheresse cutanée
- Troubles digestifs à type de nausées, vomissements
- Douleurs abdominales et diarrhées

RIFADINE 300 mg ou RIMACTAN 300 mg



2 GÉLULES LE MATIN À JEUN OU UNE FOIS PAR MOIS

Effets indésirables les plus fréquents

- Maux de tête
- Coloration orangée des larmes (attention aux lentilles)
- Nausées, vomissements
- Perturbation du bilan hépatique
- Interactions médicamenteuses par induction enzymatique : peut diminuer l'efficacité d'autres médicaments, notamment la pilule contraceptive et les anticoagulants

DISULONE 100 mg (dapsone + fer oxalate)



1 COMPRIMÉ LE MATIN

Effets indésirables les plus fréquents

- Anémie, essoufflement
- Méthémoglobinémie

Si souche résistante, contre-indication ou intolérance à la DISULONE, elle peut-être remplacée par :



ZECLAR 250 mg (clarithromycine)



2 COMPRIMÉS LE MATIN AVEC DE LA NOURRITURE

Effets indésirables les plus fréquents

- Maux de tête, modification du goût
- Nausées, douleurs abdominales
- Perturbations du bilan hépatique

Les alternatives sont l'ofloxacine ou la minocycline (cf recommandations OMS)